

## KARTOFFELBEIZEN

**0,2 l/t Moncut** gegen Rhizoctonia solani (Silberschorf wird miterfasst)  
**2 kg/t Symphonie** zum Stäuben vor/beim Legen gegen Rhizoctonia solani  
**1 – 3 l/ha Promesa** Furchenbehandlung gegen Rhizoctonia und Colletotrichum –  
Beratung anfordern!

### Drahtwurmbekämpfung:

**12 kg Picador 1,6 MG** oder **24 kg Belem/ha**

Wichtig: gleichmäßige Verteilung im Damm

Mikrogranulatdüngung: 20 kg Pannon Starter/ha (Erhöhung Knollenansatz)

## HERBIZIDANWENDUNG

### VA – UNKRAUTBEKÄMPFUNG

(Vor dem Durchstoßen der Kartoffel):

**2,5 – 3 l Stallion SyncTec + 0,5 kg Citation/ha** **Vorauflauf!**

oder:

**NEU**

**3-4 l Fantasia + 0,5 kg Citation/ha** (Fantasia = neues, modernes 800 g/l Prosulfocarb-Produkt)  
(Nachtschatten, Klettenlabkraut) **Vorauflauf bis früher Nachauflauf**

**Praxistipp bei Stechapfel & Nachtschatten**

**3 l Stallion SyncTec + 1,5 l Proman + 2 l Fantasia/ha** **Vorauflauf**

Vorauflauf auch in Metribuzin-unverträglichen Sorten

### NA – UNKRAUTBEKÄMPFUNG:

**0,5 kg Citation/ha im VA** gegen Melde/Gänsefußarten (**Vorauflauf**)

gefolgt von

**40 g Titus + 0,25 l Gondor + 2 l Wuxal P Profi/ha** im NA (bei 10 - 20 cm Kartoffelhöhe)

gegen Amarant, Kamille, Hirsen, Flughafer,

oder

**0,33 kg Citation/ha im VA**

gefolgt von

**40 g Titus + 0,2 kg Citation im NA + 0,25 l Gondor + 2 l Wuxal P Profi/ha**

(bei Trockenheit – 2. Meldenwelle)

### GRÄSERBEKÄMPFUNG

**1,25 l Panarex/ha** gegen Flughafer, Wildhirsen, (Quecke 2,25 l Panarex/ha)

oder

**1 l Centurion plus/ha** gegen Schadgräser inkl. Raygräser und Rispen (Quecke 2,5 l/ha)

## FUNGIZIDSTRATEGIE – KARTOFFEL:

Beginn vor Reihenschluss, Spritzintervall 10 – 12 Tage



- 1. 0,4 I Zorvec Endavia /ha**  
Oxathiapiprolin, Bentiavalicarb
- 2. 1,5 I Diprospero + 0,75 I Dagonis/ha**  
Dimethomorph, Propamocarb + Fluxapyroxad, Difenconazol,
- 3. 0,4 I Zorvec Endavia + 0,5 I Promesa/ha**  
Oxathiapiprolin, Bentiavalicarb + Azoxystrobin,
- 4. 1,5 I Diprospero + 1,25 I Revyona/ha**  
Dimethomorph, Propamocarb + Mefentrifluconazol
- 5. 0,75 I Presidium + 0,5 I Promesa/ha**  
Dimethomorph, Zoxamid + Azoxystrobin
- 6. 0,45 kg Reboot + 0,5 I Narita/ha**  
Cymoxanil, Zoxamid + Difenconazol
- 7. Kwizda Kartoffelpack für 4,2 ha**  
**1,2 I Prevint flow + 0,24 I Winner/ha**  
Ametoctradin, Fluazinam
- 8. 0,4 I Winner /ha**  
Fluazinam

+ 4 I Wuxal P Profi/ha

**Wuxal P Profi/ha**  
Fördert den Knollenansatz

**3 I Wuxal K40/ha**  
schützt vor **Trockenstress**

**5 - 10 I Azo Speed/ha**  
N, S, Mg

**0,5 – 1 I Korn Speed/ha**  
Mn Dünger inkl. Cu und Zn

Stopspritzung bei sichtbaren Phytophthorabefall:

**0,45 I Reboot + 0,4 I Winner oder 2l Diprospero + 0,4l Winner**

## STRATEGIE KARTOFFELKÄFER:

- 1. 50 ml Spintor + 100 g Mospilan 20 SG + 0,15 Designer/ha**  
nach ca. 10 – 12 Tagen
- 2. 0,25 I Alverde + 0,15 I Designer/ha**

## BLATTLÄUSE:

**250 g Mospilan 20 SG/ha** (Virusüberträger v.a. in Pflanzkartoffeln)

**Praxistipp:** + 0,15 I Designer/ha zu den Fungizidspritzungen **Anhaftung – Sticker, Regenfestigkeit + Verteilung**, (speziell für Tauspritzungen und bei regnerischem Wetter)

**KEIMHEMMUNG AM FELD: 5 kg Royal MH** (in ca. 400 – 500 l Wasser/ha)

### Anwendung:

- Speisekartoffel min. 25 mm, Industriekartoffel min. 35 mm Ø
- Termin: meist Anfang - Mitte Juli, wüchsige Bedingungen!
- Sikkation frühestens 3 Wochen nach Anwendung von Royal MH

## SIKKATION:

**1,6 I Kabuki Go/ha** (= 0,8 I Kabuki + 0,8 I Gondor) + **2 I EMU 11 E/ha**  
(1-2 x – Abstand ca. 7 Tage, je nach Sorte oder ca. 1-3 Tage nach Schlägeln,  
oder 7 Tage nach Reglone-Vorlage)

Centurion Plus 4254, Panarex 3201, Mospilan 20 SG 2830, Belem 3553, Stallion Sync TEC 3483, Picador 4109; Royal MH 3281, Winner 2528, Titus 2478, Narita 3523, Promesa 4286, Citation 3600, Zorvec Endavia 4176, Kabuki Go 2907, Moncut 3488, Symphonie 3487, Reboot 3640, Presidium 3749, Dagonis 4036, Spintor 3296, Prevint Flow 4221-901, Diprospero 4161, Fantasia 4342, Proman 3662, Revyona 4287, Alverde 2911,